

الفصل الثالث

من كتاب برق للمعلومات الطبية

الكتاب الشامل تجدونه في صفحة موقع برق الطبي على الفيس بوك

باقي مواضيعنا تجدونه ايضا على صفحتنا في الفيس بوك

صفحة موقع برق الطبي

الدكتور رامي الراوي








drrami13@yahoo.com










اهم الادوية الشائعة

قبل الدخول في هذا الفصل يجب ان تعلموا ان هناك شركات متنوعة بالنسبة للأسماء التجارية ولكن المذكورة هنا هي الأكثر شيوعا










الاسم العلمي	الاسم التجاري	الاستخدام	موانع الاستخدام
Clobetasol Propionate 	ديرموفيت Dermovate 	تخفيف وعلاج اعراض الالتهاب والحكة والامراض الجلدية التي تستجيب لمشتقات الكورتيزون الموضعية مثل الصدفية والحساسية	اذا استخدم للاطفال او للحوامل يجب ان تكون لجرعة قليلة ولاقل فترة ممكنة
Atorvastatin 	ليبيتور Lipitor 	ارتفاع الكوليسترول في الدم وخلل دهون الدم المختلط	لا يعطى في حالات أمراض الكبد النشطة ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع
Herbal cough lozenges Herbal	زيكوف Zecuf	يستخدم في معالجة السعال	لا يوجد











			cough syrup
يمنع استخدامه للأشخاص دون 18 عاما ، انخفاض شديد في وظائف الكبد	يستخدم في حالات الاكتئاب لدى البالغين ، القلق ، الوسواس القهري	زولفت Zoloft 	Sertraline hydrochloride 
تناول مع مهدئات الجملة العصبية ، يستعمل بحذر عند المرضى المصابين باختلال في وظيفة المثانة وفشل شديد في وظائف الكبد والكلى ، يعطى أثناء الحمل والإرضاع للضرورة فقط	لنزلات البرد والأنفلونزا ، التهاب الجيوب الأنفية ، مزيل للاحتقان ، التهاب الأذن ، التهاب الأنف الموسمي	اكتفيد Actifed 	Pseudoephedrine HCL + Triprolidine HCL
يمنع استخدامه مع النساء الحوامل أو المرضعات ، كما يمنع استخدامه لمن يعاني من نوبات الربو ، أعراض تضخم البروستات ، مع مرضى الغدة الدرقية.	يستخدم في علاج حالات احتقان الأنف والجيوب الأنفية كما يستعمل في معالجة الأعراض المرتبطة بنزلات البرد والإنفلونزا والرشح أو مع حالات الحكة في لاتف أو الحلق ، يستعمل في حالة ارتفاع درجة الحرارة كما يعمل على معالجة حساسية الأنف كما يقوم الدواء بتجفيف الأنف و الصدر من السوائل ويعالج حالات انسداد الأنف.	دي اند نايت ان Night And Day N 	Paracetamol + Diphenhydramine + Pseudoephedrine
لا يستخدم للأطفال أقل من 6 سنوات.	يعد الدواء مهدىء قوي للسعال والكحة الجافة حيث يعتبر مادة دكستروميثور فان هيدروبروميد مهدىء قوي جدا للسعال وله تأثير المسكن ومادة الفينيل إفرين هيدروكلوريد يعمل على انقباض الاوعية الدموية الصغيرة مما يترتب عليه تخفيف احتقان الاغشية المخاطية في الجهاز التنفسي ، وبالتالي فالدواء يعد مسكن ومهدىء قوى للكحة.	كوديلار شراب Codilar Syrup 	Dextromethorphan hydrobromide+ Chlorpheniramine maleate+ Phenylephrine hydrochloride syrup
تجنب استعماله للأطفال أقل من سنتين	موسع للقصبات الهوائية ومقشع	اكسوساف ايلكسر Exosaf elixir	Theophylline + Glyceryl guaiacolate











بسبب خطر حدوث تحفيز للقلب والجهاز العصبي			
ممنوع للمرأة الحامل	يستخدم في حالات التخسيس	أورلي Orly 	Orlistat 
لا يعطى للمرضى المصابين بانتانات وحيدات النوى ، يعطى بحذر في حالات القصور الكبدي والكلوي وفي الإرضاع الحمل فئة B	التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ،التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات	امبي كلوكس Ampiclox 	Ampicillin + Cloxacillin
لا يستعمل زاناكس لفترات طويلة حيث يسبب ذلك الاعتياد عليه وادمانه بدرجات متفاوتة ، لا يعطى في حالات القصور التنفسي الحادة ، لا يعطى في الحمل والإرضاع يعطى بحذر في القصور الكبدي أو الكلوي ، لا يستخدم ممن يعانون من مشاكل في العضلات ووهن عضلي	يستخدم زاناكس في حالات التوتر والقلق الناجم عن ضغوط الحياة والعمل حيث يصفه الاطباء لمن يواجهون ضغوط شديدة في العمل او للطلبة في اوقات امتحاناتهم لتقليل التوتر والقلق ولكنه قد يسبب ايضا فقدان التركيز .	زاناكس Xanax 	Alprazolam 
يعطى بحذر في اختلال كبدى حاد ، المرضى المسنين ، تضيق الابهر الحمل فئة C	في إدارة ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية	املوديبيين Amlodipine 	Amlodipine 
يستخدم بحذر عند المرضى المصابين باضطراب شديد في الوظيفة الكبدية ،	يستخدم لمعالجة التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ،التهاب الكلية والمثانة	اموكسيسيللين Amoxicillin	Amoxicillin












تعديل الجرعة في حالات الفشل الكلوي المتوسط إلى الشديد ، وفي الإرضاع الحمل فئة B	والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات		 Amoxicillin
يمنع استخدام الدواء للاشخاص الذين يعانون من حساسية للبنسلين أموكسيسيلين	يستخدم لمعالجة الالتهابات اللوزتين ، والقصبات ويستخدم بصورة كبيرة للأطفال	اموكسيسيلين Amoxicillin 	Amoxicillin  Amoxicillin
التهاب القرنية الظهاري الحلبي الحاد ، الأمراض الفطرية لمكونات العين التصنيف بالنسبة للحمل النمط C	الحالات الالتهابية المستجيبة للستيرويدات في الملتحمة الجفنية والبصلية ، والقرنية ، والقسم الأمامي لكرة العين	أوفتاديكس Ophtadex 	Dexamethasone sodium phosphate 
لا توجد موانع	لعلاج الانتفاخ والمغص في الأطفال	سيميثكون نقط Simethicone oral drops 	Simethicone $\text{H}_3\text{C}-\text{Si}\left(\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array}\right)-\text{O}-\text{Si}\left(\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array}\right)-\text{CH}_3 + \text{SiO}_2$
لا توجد موانع	يستخدم في حالة الانتفاخ وبلع الهواء وسوء الهضم ، المغص المعوي ، اضطرابات الجهاز الهضمي	ببي ريس Baby rest 	Simethicone $\text{H}_3\text{C}-\text{Si}\left(\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array}\right)-\text{O}-\text{Si}\left(\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array}\right)-\text{CH}_3 + \text{SiO}_2$
في حالة القصور الكبدي او الكلوي	يستخدم كمسكن للالام	ريليف Relief 	Diclofenac Sodium+ Paracetamol +Chlorpheniramine Maleate + Magnesium Trisilicate









			
في حالات الجلوكوما ، والتهاب الفيروسى أو الطفيلي للعين ، وجود ثقب في طبلة الأذن	تستعمل في حالات الحساسية والتهاب في العين والأذن والأنف	اودوسول ان Odosol n 	Betamethasone sod. + Neomycin sulphate + Thiomersal
يعطى بحذر في حالات القصور الكبدى والكلى وفي الإرضاع الحمل فئة B	التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ، التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات	اوكتنتين Augmentin اموكسيكلاف Amoxiclav 	Amoxicillin + Clavulanic acid
يجب الحذر عند استخدامه لمرضى القرحة المعدية ، الربو ، مرضى الكبد ، مرضى الكلى	يستخدم في تسكين الالام الأسنان واللثة ، نوبات النقرس الحادة ، لإلتهابات والتورمات بعد العمليات الجراحية ، عسر الطمث ، الام العمود الفقري والام الركبة	اولفين Olfen 	Diclofenac sodium 
يجب استخدامه عند الضرورة فقط اثناء الحمل بعد استشارة الطبيب ، يمنع استخدامه في حالات الربو ، التهاب الأنف الحاد ، نزيف الأمعاء ، القرحة الهضمية ، القصور الكبدى ، القصور الكلى.	مسكن للألم ومضاد للروماتيزم	دولفين جيل Dolphin Gel 	Diclofenac sodium 
لا يستخدم في حالات السعال الناتج عن التدخين	يساعد على تخفيف البلغم (المخاط) وإفرازات الشعب الهوائية.	غوايفينيزين Guaifenesin	Guaifenesin











			
<p>في حالات الذبحة الصدرية العرضية التي تظهر في سياق بعض الأمراض كعرض لنقص الأوكسجين مثل فقر الدم - النزيف الدماغي ، الجلوكوما ، يجب الحذر عند الاستعمال خلال فترة الإرضاع ، لا يستعمل خلال الحمل إلا للضرورة القصوى</p>	<p>في معالجة الذبحة الصدرية وللوقاية منها ، وفي معالجة القصور القلبي</p>	<p>ايزورديل Isordil</p> 	<p>Isosorbide dinitrate</p>  <p>isosorbide dinitrate</p>
<p>يستخدم بحذر في حالات تضخم البروستات واحتباس البول وانسداد الاثنى عشر وأمراض الكبد والفشل الكلوي وفي الصرع ، في الحمل والإرضاع يستعمل للضرورة القصوى</p>	<p>مضاد للسعال ، طارد للبلغم مضاد للحساسية.</p>	<p>ايزيلين Isilin</p> 	<p>Diphenhydramine HCL + Ammonium Chloride</p>
<p>يجب ضبط الجرعة بدقة لمرضى الاعتلال الكلوي ، الحمل فئة C الفترة الأولى من الحمل وفئة D الفترة الثانية والثالثة من الحمل</p>	<p>فرط ضغط الدم الأساس والخيبت معالجة قصور القلب الاحتقاني</p>	<p>اينابريل Enapril</p> 	<p>Enalapril</p> 
<p>لا يعطى في الجلوكوما ، تسرع القلب ، ضخامة البروستات واحتباس البول ، الوهن العضلي الوخيم ، يعطى بحذر خلال الإرضاع والحمل خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل</p>	<p>تشنجات الجهاز الهضمي ، تشنج الاقنية الصفراوية ، تشنجات الجهاز البولي ، عسر الطمث ، الإقياء بعد العمل الجراحي</p>	<p>بسكوپان Buscopan سبازمين انتي Anti spasmen</p> 	<p>Hyoscine-n-butyl bromide</p> 
<p>يجب أن لا تستخدم أكثر من 15 غم من المرهم في يوم</p>	<p>يستخدم لعلاج مرض الصدفيه</p>	<p>دايفوبيت Daivobet</p>	<p>Betamethasone dipropionate+</p>











واحد وأكثر من 100 غم في أسبوع واحد			calcipotriol hydrate
يعطى بحذر في مرض السكري ، قد يغير الاستجابة للأنسولين ، الأطفال ، والمرضى ، المسنين ، الحمل الفئة B	مضاد للقيء ، علاج ركود المعدة بعد الجراحة والسكري.	Plasil بلازيل Primperan بريمبران 	Metoclopramide HCL 
لا يعطى في حالات القرحة الهضمية ، نزف داخل القحف ، الإرضاع يعطى بحذر في الحمل وللأطفال	مضاد لتجلط الدم ، الحد من تصلب الشرايين ، السكتة الدماغية	بلافكس Plavix 	Clopidogrel 
يستخدم بحذر عند المرضى المصابين باضطراب شديد في الوظيفة الكبدية ،تعديل الجرعة في حالات الفشل الكلوي المتوسط إلى الشديد ، وفي الإرضاع الحمل فئة B	التهاب القصبات ، التهاب اللوزتين والبلعوم والأذن ،التهاب الكلية والمثانة والاحليل ، التهاب العظم والنقي ، التهاب الجلد والأنسجة ، تجرثم الدم ، التهاب شغاف القلب ، التهاب السحايا ، التهابات ما بعد العمليات	بلموكلوكس Pulmoclox 	Amoxicillin + Cloxacillin
يوصى خاصة النساء الحوامل بعدم استعمال هذا الدواء	لعلاج التهاب وخشونة المفاصل	دوروفين Dorofen 	Glucosamine sulfate 
لا يستعمل للذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية ، المرضى ذوي ارتفاع ضغط دم شديد ، يستعمل في الحمل للحاجة فقط في الأشهر الستة الأولى من الحمل لا يجوز في الأشهر الثلاثة	مضاد للحساسية ، معالجة السعال المترافقة باضطرابات تحسسية ،مضاد احتقان.	بولارامين Polaramine 	Dexchlorpheniramin e 










الأخيرة ، يجب اخذ الحذر للمرضعة			
لا يجوز استخدامها في المرضى الذين يتعافون من احتشاء عضلة القلب	يساعد على تعديل مزاج المريض و إزالة الاكتئاب.	تريبتيزول Tryptizol 	Amitriptyline 
يعطى بحذر في اختلال كلوي ، كبدي ، الوهن ، يمنع استخدام الدواء في فترة الحمل	الوقاية من التهاب الشعب الهوائية المزمن من التفاقم ، التهاب اللثة ، علاج السيلان	تتراسايكلين Tetracycline 	Tetracycline  tetracycline
الأشخاص الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الدم يسمى البورفيريا	علاج القرحة الهضمية، منع النزيف المتكرر من القرحة الهضمية، مرض الجزر المعدي المريئي ، علاج ومنع القرحة الهضمية في الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (المسكنات) ، إفراز مفرط لحمض المعدة بسبب ورم أو تضخم في البنكرياس (متلازمة زولينجر إليسون)	زانتاك Zantac 	Ranitidine 
يعطى بحذر في الجلوكوما ، تضخم البروستات ، فشل القلب الحاد ، يعطى بحذر أيضا في الحمل والإرضاع	مضاد للحساسية	تفاجيل Tavegil 	Clemastine 
الجلوكوما ، المسنين ، تضخم البروستات ، الحمل فئة C	مهدي ، وفي حالات سلس البولي ، اتقاء الأوعية الدموية والصداع	تفرانيل Tofranil 	Imipramine HCL 
يعطى بحذر في حالات اختلال كلوي ، المرضى المسنين ، وفي الحمل والإرضاع	علاج قرحة الاثني عشر وقرحة المعدة ، العلاج والوقاية من حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضية والحامض في المعدة ، الوقاية والعلاج من التوتر	تكامت Tagamet	Cimetidine











	الناجم عن النزيف في الجهاز الهضمي العلوي		
يعطى بحذر في حالات أمراض القلب ، أمراض الكبد ، المسنين ، تضخم البروستات الحمل فئة C	علاج الصرع ، بعض آلام الأعصاب	تكريتول Tegretol 	Carbamazepine 
تناذر جيبي ، قصور بطيني ، أيسر ، حصار أذيني بطيني ، لا يوصف للحامل أو المرضع أو الأطفال	العلاج الوقائي لهجمات خناق الصدر خاصة عند الجهد ، معالجة ارتفاع التوتر الشرياني الأساسي	التيازيم Altiazem 	Diltiazem 
الحساسية للدكسترومثورفان، او للمواد المستخدمة في المركب	مضاد للسعال الجاف	توسيلر Tussilar 	Dextromethorphan 
الامساك ، يعطى بحذر لمرضى الربو ، الاطفال اقل من سنتين	مهدئ للسعال الجاف ، موسع للشعب الهوائية ، مضاد للحساسية	Tussiram Tussivan 	Chlorpheniramine maleate + Phenylephrine HCL + Ephedrine HCL + Codeine phosphate
لا يستعمل في حالة الحمل والإرضاع.	معالجة السعال الجاف والارجي.	توكسيل Toxil 	Dextromethorphan HBr + Oxomemazine HCl + Sodium Benzoate
في الحمل والإرضاع يجب استشارة الطبيب ، لا تستعمل هذا الدواء مع	مسكن للسعال و مضاد للاحتقان ومضاد تحسس ومسكن آلام وخافض للحرارة	D تولين Tullin-D 	Paracetamol + Chlorpheniramine + Dextromethorphan HBr +












أدوية أخرى تحتوي براسيتول			Pseudo-Ephedrine HCl
وجود عدسات لاصقة ، يجب استشارة الطبيب للحوامل والمرضعات قبل الاستعمال	التخفيف المؤقت من الحرقه والتهيج الناجم عن جفاف العين ، الوقاية من حدوث تهيج آخر	تيرموند Tearmond 	Glycerin + Hypromellose + Polyethylene glycol
اختلال كبدى أو كلوي ، الوهن ، الحمل أو الرضاعة (وإن لم يثبت سلامة) ، تم استخدامها بدون ضرر أثناء فترة الحمل	علاج أشكال مختلفة من الاكتئاب ، الوسواس القهرى ، اكتئاب المسنين	بروزاك prozac 	Fluoxetine 
في حالة القصور الكبدى او الكلوي ، لا يعطى للحوامل	علاج داء السكري نوع الثاني	داونيل Daonil 	Glibenclamide 
الحمل خاصة الأشهر الثلاث الأولى والمرضع	للالتهابات الفطرية المهبلية البسيطة والقوية	شي كيت اف Shekit -f 	Fluconazole + Azithromycin + Secnidazole
يراعى تخفيض الجرعة في كبار السن والمرضى بقصور في وظائف الكبد ، لا يعطى أثناء الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى وكذلك خلال الرضاعة والأطفال اقل من سنتين.	علاج عدوى الاميبا في الأمعاء والأنسجة الأخرى وفي خارج الأمعاء وإصابات طفيلية أخرى	دايلوزول Dilozole 	Diloxanide furoate + Metronidazole – Benzoyl
انسداد في الجهاز الهضمي	كمضاد تشنج للعضلات	دريبتا سير Drepttasir	Oxybutynin chloride













<p>، وهن الأمعاء ، التهاب القولون ، الأمراض القلبية الوعائية ، الجلوكوما ، تجنب إعطاء الدواء للحوامل والمرضعات.</p>	<p>المساء ، السلس البولي ، التبول اللاإرادي عند الأطفال ، اضطراب أو عسرة البول</p>	<p>ديتروسيام Ditospam</p> 	
<p>التهابات الجلد الفيروسية والبكتيرية ، جدري الماء ، الزهري ، تدرن الجلد ، حب الشباب ، يستعمل بحذر في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وكذلك الإرضاع</p>	<p>التهابات الناتجة عن أمراض حساسية الجلد ، والحكة الجلدية ، الحرق ، الألم</p>	<p>درمودين Dermodin</p> 	<p>Clobetasol propionate in Anhydrous paraffin</p> 
<p>يعتبر مادة سامة لا يجوز تقريبه على العينين أو الفم</p>	<p>يستعمل لحساسية الجلد ، لدغة الحشرات</p>	<p>درموكال Dermocal</p> 	<p>Calamine + Glycerine + Camphor</p>
<p>لا يعطى للأطفال اقل من 6 سنوات</p>	<p>اضطرابات القولون التشنجية ، آلام الأمعاء المرتبطة بأعراض القولون ، تهيج القولون</p>	<p>دسبتالين Duspatalin</p> 	<p>Mebeverine HCL</p> 
<p>قصور كلوي حاد ، انحباس البول ، فرط بوتاسيوم الدم ، الحمل فئة C</p>	<p>علاج ارتفاع ضغط الدم ، تشمع الكبد مع وذمة ، إدارة فشل القلب الاحتقاني</p>	<p>الدكتون Aldactone</p> 	<p>Spirolactone</p> 
<p>اضطرابات نفسية ، اضطرابات حادة للدورة الدموية الشريانية ، ذبحة قلبية ، اختلال وظيفة الكلى أو غسل الكلى ، أثناء الحمل والإرضاع يفضل استشارة الطبيبة</p>	<p>لدى النساء :اضطراب حاد للعادة الشهرية ، العقم ، سيلان الحليب خارج الفتحات الطبيعية للإرضاع. لدى الرجال : تضخم الثدي والعجز الجنسي. علاج مرض باركنسون</p>	<p>دوبرجين Dopergin</p> 	<p>Micronised Acid Lisuride + Micronised Tartaric acid + Micronised Sodium Calcium + Lactose + Magnesium Stearate + Microcrystalline Cellulose</p>











لا تستخدم أقراص جانوميت لمرضى الفشل الكلوي	يستخدم في علاج السكر من النوع الثاني	جانوميت Janumet 	Sitagliptin+ Metformin
لا يعطى في حالة قلة تجمع الصفائح الدموية . أمراض الكبد ، خلال الحمل	يعطى لتقليل الدهون في الدم ، يمنع تجمع الدم الصفائح	دوسبين A Dospin-A 	Clopidogrel Bisulfate + Atorvastatin + Aspirin
لا يعطى في حالات ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط ، يعطى بحذر في الاختلال الكلوي ، الحمل فئة B	يستعمل لعلاج عدم الاتزان في هرمون البرولاكتين عندما تزيد كمية البرولاكتين في الدم	دوستنكس Dostinex 	Cabergoline 
يستعمل بحذر عند المرضى المصابين بأمراض كبدية أو قصور كبدى ، اضطراب في نظم القلب	التهاب القصبات ، ذات الرئة ، التهاب الحنجرة ، التهاب الجيوب ، التهاب اللثة ، التهاب البلعوم ، التهاب الأذن الوسطى ، داء المقوسات ، الوقاية من داء المقوسات الخلقي أثناء الحمل	روفاميسين Rovamycine 	Spiramycin 
في حالات الجلوكوما ، وتضخم البروستات	آلام تقلصات القناة الهضمية وزيادة حركتها ، التهاب المعدة ، التهاب الأمعاء والقولون ، القرحة الهضمية ، آلام تقلصات الصفراء ، تقلص المجرى البولي ، التهاب البنكرياس	ريبال Riabal 	Prifinium bromide + Paracetamol
لا يستخدم مع أي علاج جلدي آخر ، لا يطبق على الأغشية المخاطية والجروح ، لا يستخدم أثناء الحمل	كمادة مضادة لتقرن الجلد ، لمعالجة حب الشباب ، وفي إزالة تجاعيد الوجه والكلف والحزاز المسطح وحالات الأكزيما	ريتن A Retin A ريتينويد Retinoid 	Tretinoin 
يعطى بحذر في حالات قصور بوظائف الكبد أو الكلى ،	علاج الفصام والاضطرابات العقلية الأخرى	ريسدال Risdal 	Risperidone








<p>وفي أمراض القلب والأوعية الدموية ، الصرع ، خلال الحمل والإرضاع للضرورة القصوى</p>			
<p>يعطى بحذر للأمراض الكبد (الرضاعة ، (الحمل فئة C (</p>	<p>إدارة السلسل النشط (بالاشتراك مع عوامل أخرى) ، القضاء على ناقل لمرض التهاب السحايا</p>	<p>ريفادين Rifadin</p> 	<p>Rifampicin</p> 
<p>يستخدم بحذر أثناء الإرضاع ، وفي حالات اضطرابات وظيفة الكبد ، لا يستخدم أثناء الحمل</p>	<p>طاردة للديدان ، علاج مرض الاكياس المائية و إصابة الدماغ بيرقات الديدان الشريطية</p>	<p>زنتيل Zentel</p> 	<p>Albendazole</p> 
<p>لا يعطى في حالات القصور التنفسي الحادة ، لا يعطى في الحمل والإرضاع يعطى بحذر في القصور الكبدى أو الكلوي ، لا يستخدم ممن يعانون من مشاكل في العضلات ووهن عضلي</p>	<p>حالات القلق ، حالات الاكتئاب ، اضطرابات ناتجة عن الخوف ، علاج رعاش الحركة الأساسي</p>	<p>زولام Zolam</p> 	<p>Alprazolam</p> 
<p>الربو الشعبي ، مرض انسداد الرئة ، بطء القلب ، قصور القلب ، الصدمة القلبية ، لا ينصح في الحمل والرضاعة</p>	<p>لخفض الضغط المرتفع داخل العين للمرضى الذين يعانون من الجلوكوما مفتوحة الزاوية</p>	<p>زولامول Xolamol</p> 	<p>Dorzolamide hydrochloride + Timolol maleate</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>طاردة للديدان (الإصابة بالاسكارس، الانكلوستوما، الدودة الشريطية، الدبوسية، السوطية)</p>	<p>فلوب Flub</p>	<p>Flubendazole</p>






			
لا يعطى في أمراض الكبد أو الارتفاع غير المبرر لإنزيمات الكبد ، لا يعطى للنساء الحوامل والمرضعات	ارتفاع الكوليسترول في الدم وخلل دهون الدم المختلط ، ارتفاع الدهون في الدم	سمفور Simvor سيمفاتين Simvatin 	Simvastatin 
يحظر استعمال في الأشهر الأخيرة للحمل، يجب أخذ الحذر عند الإرضاع ، كذلك يستخدم بحذر في المرضى المصابين باحتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم والقصور القلبي	الام الظهر ، التهاب المفاصل، حالات الألم المفاجئة ، ألم الأسنان ، حالات الألم والحرارة المترافقة مع الالتهاب	ديكوليف Dicoliv 	Paracetamol + Diclofenac Potassium+ Chlorzoxazone
يجب تعديل الجرعة لدى مرضى اعتلال الوظيفة الكلوية ، يجب مراقبة المرضى الخاضعين للديال باهتمام ، الحمل فئة B	التهاب البلعوم ، التهاب اللوزتين ، التهاب الجيوب ، التهاب القصبات ، التهاب الأذن الوسطى ، التهابات المجاري البولية	سوبراكس Suprax 	Cefixime 
انخفاض نسبة البوتاسيوم أو الصوديوم في الدم ، القصور الكلوي أو الكبدى أو قصور الغدة الدرقية ، توخي الحذر أثناء الحمل والإرضاع	الجلوكوما ، علاج ثانوي لبعض نوبات الصرع ، علاج مساعد في حالات الاوديما الناتجة عن هبوط القلب الاحتقاني أو عن بعض الأدوية	دياموكس Diamox سيدامكس Cidamex 	Acetazolamide 
لا يعطى للحوامل	علاج السعال الجاف والمعدن والتهيج	سيدو بكت sedo-pect 	Diphenhydramine HCL + Sodium Citrate + Codeine phosphate + Menthol









يمنع في حالات ارتفاع الجالاكتوز في الدم	يعمل على زيادة كمية الماء في البراز و بالتالي يعمل على تليينه	سيدالاك Sedalac		Lactulose 
لا يوجد موانع	يستعمل للجروح والحروق والتقرحات الجلدية	سيتريميد Cetrimide		Cetrimide 
لا يعطى للمرضى المصابين بالربو أو الارتكاس التحسسي ، لا يعطى للأطفال دون سن 10 سنة ، كما لا ينصح للمرضعات ولا يعطى للحوامل وخاصة الأشهر الأخيرة من الحمل	لتخفيف أعراض وعلامات الالتهاب العظمي المفصلي. يستخدم لشخص إذا كان يعاني من التهاب ولديه في نفس الوقت قرحة	سيلبيريكس Celebrex		Celecoxib 
لا يعطى في الجلوكوما ، إصابة بأفات جلدية ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع	لمعالجة أعراض داء باركنسون	سينامت Sinemet		Carbidopa + Levodopa
يستعمل في الحمل والإرضاع للضرورة فقط	الالتهابات الجلدية ، تطهير البور الجرثومية وفي حالات الإصابة بالدمل والحروق والجروح	فوسين Fucine فيوسيدين Fucidin		Fusidic acid 
يجب الحذر عند استخدامه لمرضى القرحة المعدية ، الربو ، مرضى الكبد ، مرضى الكلى	علاج الإلتهابات الحادة والمتوسطة وتسكين الألم بشكل سريع	فولتارين حقن Voltaren Ampoules		Diclofenac Sodium. 
يجب الحذر عند استخدامه	مسكن للألام وخافض	فولتارين		Diclofenac Sodium.







<p>لمرضى القرحة المعدية ، الربو ، مرضى الكبد ، مرضى الكلى</p>	<p>للحرارة والتهاب المفاصل والنقرس ، هشاشة العظام</p>	<p>Voltaren</p> 	
<p>يستخدم بحذر: لمرضى هبوط القلب ، القرحة المعدية ، المصابين بالجفاف ، ارتفاع ضغط الدم، خلل في وظائف الكبد أو الكلى</p>	<p>يستخدم لتسكين الآلام الحادة البسيطة و المتوسطة مثل آلام الدورة الشهرية، علاج الروماتويد و التهاب المفاصل.</p>	<p>كتافلام Cataflam</p> 	<p>Diclofenac potassium</p> 
<p>يستعمل بأمان لكن يجب تجنب فرط الجرعة</p>	<p>لتكوين الحمض النووي ومضاد للأنيميا الخبيثة</p>	<p>B12 فيتامين Vitamin B12</p> 	<p>Cyanocobalamin</p> 
<p>يستعمل بأمان لكن يجب تجنب فرط الجرعة</p>	<p>يساعد الجسم على استعمال الأحماض الامينية التي تعتبر قوالب بناء البروتينات</p>	<p>B6 فيتامين Vitamin B6</p> 	<p>Pyridoxine</p> 
<p>لا يوجد.</p>	<p>مرهم جلدي مطهر للقرح والجروح والحروق</p>	<p>بوفيدين Povidine</p> 	<p>Povidone Iodine</p> 
<p>الحمل فئة B</p>	<p>يستخدم لعلاج عدوي الهيريس التي تصيب الجلد، الفم، الأغشية المخاطية، الهيريس التي تصيب الإعضاء التناسلية. وأيضاً عدوي الهيريس زوستر و كذلك الجدري</p>	<p>زوفيراكس Zovirax</p> 	<p>Acyclovir</p> 
<p>أخذ الحذر عند الاستعمال لدى المرضى الذين يعانون من</p>	<p>علاج لارتفاع ضغط الدم ، معالجة قصور القلب الأحقتاني</p>	<p>كابوتين Capoten</p>	<p>Captopril</p>











اضطراب في وظائف الكلية ، فرط بوتاسيوم الدم كذلك الذين يعانون من تضيق في الشريان الأبهر ، يستخدم عند الأطفال في حال عدم جدوى الطرق الأخرى الخافضة للضغط الحمل فئة C			
أثناء الحمل يستعمل فقط للضرورة القصى وحسب الاحتياج	طارد للديدان.	كاتركس Katrex 	Levamisole 
لا يستعمل للحوامل والمرضعات.	أعراض تضخم البروستات الحميد ، ارتفاع ضغط الدم الخفيف أو المعتدل	كاردورا Cardura 	Doxazosin mesylate 
لا يعطى في الرجفان البطيني الليفي ، يعطى بحذر في قصور وظائف الكلى ، وحالات خلل الغدة الدرقية . يعطى في الحمل والإرضاع للضرورة القصى	حالات فشل القلب و الرجفان الأذيني الليفي	كارديكسين Cardixin 	Digoxin 
لا يوجد	يستخدم في دوالي الساقين والخصيتين	دافلون Daflon 	Diosmin + Hesperidin
لا يعطى في حالات الصدمة القلبية ، بطء كبير في نبضات القلب ،عجز في وظيفة الكبد ، الانحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثانية والثالثة ،	يستخدم في فرط ضغط الدم ، فشل القلب الاحتقاني.	ديلاترند Dilatrend 	Carvedilol







الأطفال دون 10 سنة الحمل فئة C،			
يمنع استخدامه لمن يعاني قصور بالكلى ، الكبد ، امراض القلب ، الاطفال اقل من 13 عام كما يمنع استخدامه في حالات الحمل والرضاعة.	يستخدم في علاج حالات المغص الحاد كالمغص الكلوي والصفراوي .	سبازموفين Spasmofen 	Hyoscine butylbromide+ Ketoprofen
لا يعطى لمرضى الجلوكوما	لعلاج المغص والتقلصات عند الرضع والاطفال	فيسرالجين شراب Visceralgine Syrup 	Tiemonium methyilsulfate 
لا يوجد موانع	الانتفاخ ، المغص الناتج عن الانتفاخ بسبب الغازات ، طارد للغازات	كارمينكس Carminex 	Cinnamon oil + Caraway oil + Fennel oil
قصور رئوي حاد ، تثبيط تنفسي ، تجنب الاستعمال أثناء الحمل والإرضاع.	يستعمل لكل أنواع الصرع والنوبات الصرعية التي تحدث للرضع والاطفال والبالغين	ريفوتريل Rivotril 	Clonazepam 
لا يستعمل في الحالات : تدرن الجلد ، الإصابات الجلدية الإفرنجية ، والإخماج الفيروسي في الجلد ، يستعمل أثناء الحمل والإرضاع للضرورة فقط.	لمعالجة الالتهابات الجلدية والفطرية والحكة والتهسس الجلدي	كوادريدريم Quadriderm بولي ديرم Polyderm تتراديرم Tetraderm	Betamethasone + Gentamicin + Clioquinol + Tolnaftate








			
لا يعطى في فرط الغدة الدرقية ، بطء القلب ، يجب إخبار طبيب التخدير في حال استعمال هذا العلاج قبل العملية الجراحية ، لا يعطى بعد الشهر الرابع من الحمل	للوقاية من بعض أنواع الاضطرابات في نظم القلب ومعالجتها	كوردارون Cordarone	Amiodarone HCL 
الحساسية من المادة ، اطفال اقل من 10 سنوات	إضطرابات وظائف المعدة والامعاء ، حالات المغص بالقناة الهضمية ، القولون العصبي	كولونا Colona	Sulpiride +Mebeverine HCL
فرط الحساسية لمادة كيتوتيفين.	علاج وقائي لحدوث الربو الشعبي ، الوقاية وعلاج إضطرابات الحساسية	بروفيلار PROFILAR	Ketotifen Hydrogen Fumarate 
مرض الكبد النشط. الرضاعة الطبيعية. الحمل	يستخدم في ارتفاع الكوليسترول في الدم وخلل دهون الدم المختلط	اتور Ator	Atorvastatin 
ينصح بعدم الاستعمال عند وجود إصابات فطرية أو حمى راشحة أو أفات جرثومية في الفم والحلق	معجون لمعالجة تقرحات الفم	كينالوغ Kenalog	Triamcinolone Acetonide 










<p>الجلوكوما ، خطر الاحتباس البولي ، أمراض القلب والشرابين ، أمراض الكبد ، يستخدم بحذر في مرض السكري ، أمراض الجهاز التنفسي تضخم البروستات ، أورام الجهاز العصبي المركزي ، صرع ، انسداد معوي ، في الحمل أو الإرضاع : لم تثبت السلامة</p>	<p>يستعمل في بعض اضطرابات المزاج ، الفواق العنيد ، الغثيان والقيء.</p>	<p>لارجكتيل Largactil</p> 	<p>Chlorpromazine HCL</p> 
<p>يعطى بحذر في المرضى الذين يعانون من الصرع ، المسنين ، مرضى اختلال كلوي ، والرضاعة ، والأطفال الحمل فئة C</p>	<p>معالجة التشنج ، علاج التشنج الشديد الناشئة في الحبل الشوكي ، إدارة الألم في التهاب العصب الثالث</p>	<p>ليورسال Lioresal</p> 	<p>Baclofen</p> 
<p>لا يوجد</p>	<p>تخفيف آلام المغص ، تخفيف الحموضة والنفخة عند الأطفال</p>	<p>ماء غريب Gripe Water</p> 	<p>Dill seed oil + Sodium bicarbonate</p>
<p>ينقص الاموكسيسيلين من فعالية مانعات الحمل الفموية. الحمل فئة B</p>	<p>التهاب الجهاز التنفسي ، التهاب اللوزتين ، التهاب الجيوب الأنفية ، التهاب الأذن الوسطى ، التهاب المسالك البولية والتناسلية ، التهاب البروستات ، التهاب الجلد والأنسجة ، خراجات داخل البطن ، خراج الرئة.</p>	<p>ماكسبين Maxipen</p> 	<p>Amoxicillin + Flucloxacillin</p>
<p>يجب الحذر عند الإعطاء للام المرضعة ، لا ينصح باستعماله للمرأة الحامل في الأشهر الثلاثة الأولى</p>	<p>لعلاج التهابات الفطرية وكذلك الالتهاب الثانوي الناتج عن البكتيريا</p>	<p>مايكوهيل Mycoheal</p> 	<p>Miconazole Nitrate</p> 
<p>لا يعطى في الجلوكوما ، انحباس البول</p>	<p>الآلام الخفيفة والمتوسطة كحالات اضطراب</p>	<p>مايوجسك Myogestic</p>	<p>Orphenadrine citrate +</p>

<p>الوهن العضلي ، لا يعطى للأطفال دون 10 سنة ، يعطى بحذر للمرضى الذين يعانون من خفقان القلب ، يعطى بحذر في الحمل والإرضاع</p>	<p>العضلات ، آلام أسفل الظهر ، انزلاق الغضروف ، آلام المفاصل ، الصداع ، آلام عسر الطمث</p>	<p>كاناجيسك Kanagesic</p> 	<p>Paracetamol</p>
<p>يمنع إستخدامه لمرضى الضغط بسبب إحتوانه علي كميات كبيره من الصوديوم الذي يقوم بحبس الماء بالجسم ورفع الضغط.</p>	<p>يستخدم لمعادلة حموضة المعدة</p>	<p>فوار فروت Fawar Fruit</p> 	<p>Sodium bicarbonate + Tartaric acid + Citric acid</p>
<p>يمنع استخدامه في المرضى الذين أظهروا فرط الحساسية للعلاج</p>	<p>علاج قرحة الأثني عشر علاج القرحة المعدية</p>	<p>انتودين Antodine</p> 	<p>Famotidine</p> <chem>Nc1nc2nc(NCSCCNC(=O)N)nc2n1</chem>
<p>لا يجوز الاستعمال في اضطراب الوظيفة الكبدية والكلى ، ولا يجوز أثناء الحمل</p>	<p>في حالات النزوف النسائية ، الوقاية من النزف الرحمي بعد الولادة</p>	<p>Methergin Ergot</p> 	<p>Methylergometrine</p> <chem>CC[C@H](O)CNC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C(=CC=C2)N)C[C@H]3N</chem>
<p>لا يستعمل في القرحة الهضمية ، القصور الكبدي الحاد والقصور الكلوي الشديد ، لا يعطى للأطفال وأثناء الحمل والإرضاع</p>	<p>لعلاج أعراض الالتهابات الرئوية ، لعلاج أعراض الالتهاب العظمي المؤلم) داء المفاصل ، الداء المفصلي التنكسي)</p>	<p>موبك Mobic</p> 	<p>Meloxicam</p> <chem>Cc1cc2nc(C(=O)Nc3cc(O)c4c(c3)S(=O)(=O)N4)cnc2s1</chem>
<p>نزف المعدة والأمعاء ، انسداد أو ثقب في الجهاز الهضمي ، ينصح باستشارة الطبيب أثناء الحمل ، لا يستخدم أثناء الإرضاع</p>	<p>معالجة أعراض الغثيان والقيء وحالات عسر الهضم</p>	<p>Motalon Motilium</p> 	<p>Domperidone</p> <chem>Cc1cc(NC(=O)N2CCN(CCN2C3=CC=CC=C3C(=O)N)C4=CC=C(C=C4)Cl)cc1</chem>








<p>خلل في وظائف الكلى ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم ، في حالات تعاطي أدوية تحتوي على البوتاسيوم ، لا يعطى في الحمل والإرضاع</p>	<p>مدر للبول في حال ارتفاع ضغط الدم ، في حالات تليف الكبد المصحوب باستسقاء.</p>	<p>مودوريك Moduretic</p> 	<p>Amiloride Hydrochloride + Hydrochlorothiazide</p>
<p>يعطى بحذر في القصور الكبدى أو الكلوي أو القصور التنفسي لا يعطى في فقدان الوعي ، فرط التوتر داخل القحف ، الأطفال ، الصرع ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصى.</p>	<p>مسكن مركزي قوي يستعمل لتسكين الآلام المتوسطة أو الشديدة</p>	<p>ترامادول Tramadol</p> 	<p>Tramadol HCL</p> 
<p>فرط الحساسية لهذا الدواء، وذمة وعائية</p>	<p>يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم</p>	<p>ليزيناويل Lisinopril</p> 	<p>Lisinopril</p> 
<p>لا يعطى في حالة انسداد الشريان التاجي ، احتشاء العضلة القلبية</p>	<p>لعلاج ارتفاع ضغط الدم</p>	<p>A هبيريل Hipril – A</p> 	<p>Amlodipine + Lisinopril</p>
<p>لا يستعمل في نوبات الربو الحادة ، الإرضاع ، يستعمل بحذر في أمراض الكبد ،المسنين ، الحمل فئة B</p>	<p>مضاد للحساسية.</p>	<p>الليريجيكس فورت Allergex fort</p> 	<p>Chlorpheniramine</p> 
<p>مضاد استتباب في التثبيط الشديد والسمي للجملية العصبية المركزية ، داء باركنسون ، يعطى للضرورة القصوى في الحمل ، يجب تجنب الارضاع عند</p>	<p>الاضطرابات النفسية ، علاج مشاكل السلوك الشديدة عند الأطفال مفرطي الحركة ، اضطرابات التقلصات اللاإرادية</p>	<p>هادول Haldol</p> 	<p>Haloperidol</p> 










<p>أخذ العلاج ، يعطى بحذر للمصابين باضطرابات قلبية وعائية</p>			
<p>ضخامة البروستات ، الزرق مغلق الزاوية ، قرحة المعدة والاثني عشري ، الأمراض القلبية والكلى الحادة الانتانات الفيروسية كالحماق وشلل الأطفال ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع ، لا يعطى مع الاندوسيد والأسبرين ، لا يعطى للأطفال دون سنتين ، يعطى بحذر في حالة الصرع</p>	<p>التهاب الأنف التحسسي بأنواعه ، التحسس لغبار الطلع وحمل الكلى ، الإصابات الجلدية الارجية مثل الاكزيما ، التهاب الملتحة التحسسي.</p>	<p>هيانيل Hayanil</p> 	<p>Dexamethasone + Dexchlorpheniramin e + Ascorbic Acid (Vit .C)</p>
<p>يعطى خلال الحمل والإرضاع للضرورة فقط</p>	<p>الأمراض الناشئة عن اضطراب ايض الكالسيوم ، لين العظام ، الكساح ، نقص الكالسيوم عند الأطفال حديثي الولادة ، سوء امتصاص الكالسيوم في حالات الكساح</p>	<p>ون ألفا One – Alpha</p> 	<p>Alfalcidol</p> 
<p>لا يعطى خلال الحمل والإرضاع إلا للضرورة</p>	<p>معالجة أعراض التهاب الأنف التحسسي الفصلي وتشتمل على (: العطاس ، سيلان الأنف ، حكة في الأنف وباطن الفم والحنجرة ، تدمع واحمرار العين) ، المعالجة العرضية للحكة الناجمة عن ألسري الجلدي المزمن.</p>	<p>زاناكس Xanax</p> 	<p>Fexofenadine HCL</p> 
<p>لا ينصح باستعمالها في معالجة الاحماج العينية القححية الحادة ، وداء القوباء السطحي الحاد ، وجدري البقر ومعظم الأمراض الفيروسية الأخرى للقرنية والملتحمة</p>	<p>علاج التهابات التي تستجيب للسررويد والأعراض التحسسية غير الخمجية الخفيفة المتوسطة للجفن والملتحمة البصلية والقسم الأمامي للعين والقرنية.</p>	<p>ابي كورت Apicort</p> 	<p>Prednisolone acetate + Benzalkonium chloride</p>









<p>الربو القصبي ، بطء القلب الجيبي ، الصدمة القلبية ، لا ينصح للحوامل وكذلك الأطفال</p>	<p>في خفض الضغط الداخلي للعين ، وفي الجلوكوما المزمنة والجلوكوما الثانوي</p>	<p>ابيمول Apimol تيمولير Timolyre</p> 	<p>Timolol maleate</p> 
<p>يمنع استخدامه في حالة المرضى الذين يعانون من فرط الحساسية لأي من مكونات الدواء</p>	<p>تستخدم القطرة في علاج التهابات العين التي تنتج عن الإصابة بالعدوى كما يستعمل في علاج حالات التهاب القرحة التي تصيب القرنية أو في حالات التهاب القرنية والتهاب الملتحمة.</p>	<p>إيكونوبريد بلس Econopred Plus</p> 	<p>Prednisolone acetate</p> 
<p>يمنع استخدامه لمن يعاني من حالات الحساسية لأي من مكونات الدواء ، يمنع استخدامه مع الأطفال دون سنتين</p>	<p>يستخدم في حالات الحساسية المختلفة حيث يعالج كلاً من سيلان الأنف و العطس والحكة كما يستخدم في حالات العيون الدامعة وحكة في الأنف والحنجرة وايضاً حساسية في جيوب الأنفية</p>	<p>زيرتك Zyrtec</p> 	<p>Cetirizine hydrochloride</p> 
<p>في حالة وجود ثقب في طبلة الأذن ، للحوامل إلا للضرورة ، ويعطى بحذر للمرضعات ، لا يستعمل أكثر من 10 أيام</p>	<p>التهاب الأذن الوسطى ، التسكين الفوري للألم وتخفيف الالتهاب في المراحل الاحتقانية ، وكعلاج مساعد مع المضادات الحيوية</p>	<p>أتوكاين Otocain</p> 	<p>Phenazone + Procaine HCL</p>
<p>يعطى بحذر في حالات اختلال كلوي أو كبدي ، المرضى المسنين ، عدم انتظام ضربات القلب البطيني ، لا يعطى الأطفال والإرضاع الحمل فئة C</p>	<p>ارتفاع ضغط الدم الذبحة الصدرية</p>	<p>أدالات Adalat</p> 	<p>Nifedipine</p> 
<p>يستعمل بحذر للمرضى الذين لديهم خلل في وظائف الكبد ، يستعمل بحذر في الرضاعة</p>	<p>عدوى الجهاز التنفسي ، السعال الأديكي ، التهاب الرئوي ، الدفترية ، الاميبا المعوية ، التهاب الجلد ، التهاب الجهاز</p>	<p>اريثرومايسين Erythromycin</p>	<p>Erythromycin</p>







<p>الحمل فئة B</p>	<p>البولي والتناسلي</p>	<p>Erythromycin Tablets BP 250mg</p> 	
<p>لا يستعمل في حالات القصور الكبدي الحاد ، يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى</p>	<p>التهاب الجهاز التنفسي ، التهاب الأذن الوسطى ، التهابات الجلد ، الكلاميديا ، التهاب البلعوم ، التهاب اللوزتين</p>	<p>ازي ونس Azi-once</p> 	<p>Azithromycin Azithromycin</p> 
<p>في حال حدوث حساسية مع المسكنات الأخرى ، اضطرابات النزف أو الصفائح ، يعطى بحذر في القرحة ، أمراض الكلى الشديدة أو كبدي حاد ، في الحمل لا يستعمل ابتداء من الشهر السادس للحمل ولا يستعمل أثناء فترة الإرضاع</p>	<p>التهاب المفاصل الروماتيزم ، هشاشة العظام ، ألم خفيف إلى معتدل ، الحمى</p>	<p>اسبجك Aspegic</p> 	<p>Acetylsalicylic acid Lysine</p> 
<p>تجنبها في المرضى الذين يعانون من التعصب ، في حديثي الولادة ، يعطى بحذر للأشخاص ممن لديهم ضعف السمع ، والأطفال الخدج ، السمنة المرضي / الرضاعة ، والرضع وحديثي الولادة (لم يثبت سلامة) الحمل فئة C</p>	<p>علاج الالتهابات الجرام سلبية خطيرة العصوي والالتهابات التي تسببها العنقوديات عند موانع بنسليبات أو غيرها من المخدرات أقل سمية</p>	<p>اميكاسين Amikacin</p> 	<p>Amikacin</p> 
<p>الذين يعانون من أمراض الكبد الحادة ، الإسهال المرتبطة بالتهاب القولون الغشائي الكاذب ، الأطفال دون سنتين ، الحمل فئة C</p>	<p>مضاد للإسهال.</p>	<p>انترستوب Enterostop لوموتيل Lomotil</p> 	<p>Diphenoxylate HCL + Atropine sulphate</p>
<p>انخفاض الضغط الشديد ،</p>	<p>الألم الصدري الحاد الناجم</p>	<p>انجسيد</p>	











<p>فقر الدم الشديد ، ارتفاع الضغط داخل القحف بسبب الرض أو النزف الدماغي ، الحمل والإرضاع</p>	<p>عن الذبحة الصدرية ، احتشاء القلب</p>	<p>Angised www.worldwidepharmacies.info gsk GlaxoSmithKline Angised™ Tablets Glyceril Trinitrate (Stabilised) 0.5 mg GLYCERYL TRINITRATE 0.5 mg/Tab 100 Tablets</p>	<p>glyceryl trinitrate</p> $\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{ONO}_2 \\ \\ \text{HC}-\text{OH} \\ \\ \text{H}_2\text{C}-\text{ONO}_2 \end{array}$
<p>لا يعطى للأشخاص الذين لديهم احتباس البول ، لا يعطى للحوامل والمرضعات</p>	<p>علاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب</p>	<p>انجيزار H Angizaar -H</p>	<p>Losartan potassium + Hydrochlorothiazide</p>
<p>لا يعطى في حالة القرحة ، التهاب المستقيم ، يعطى بحذر للمرضى المسنين ، الإرضاع والحمل</p>	<p>التهاب المفاصل الروماتيزم ، التهاب المفاصل النقرسي ، هشاشة العظام التهاب الفقر المقسط ، مسكن للآلام</p>	<p>اندوسيد Indocid</p>	<p>Indomethacin</p> $\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{C} \\ / \quad \backslash \\ \text{C}_6\text{H}_4 \quad \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{H}_3\text{C}-\text{O} \quad \text{C}=\text{O} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4-\text{Cl} \end{array}$
<p>لا يجوز الاستعمال في حالات الصدمة القلبية ، انسداد المجاري التنفسية ، حصار قلبي ، تباطؤ ضربات القلب لا يستعمل في الحمل والإرضاع</p>	<p>ارتفاع ضغط الدم ، اضطراب نظم القلب ، تسرع ضربات القلب ، اعتلال العضلة القلبية ، الاحتشاء</p>	<p>انديرال Inderal</p>	<p>Propranolol</p> $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_5 \\ \\ \text{OH} \end{array}$
<p>التهاب القرنية السطحي القوباء البسيط ، إصابة العين الناتجة من البكتريا الفطرية ، الجلوكوما) الماء الأزرق) لا ينصح في الحمل والرضاعة</p>	<p>لمعالجة حالات العين المستجيبة للاستيرويدات والتي تتطلب في نفس الوقت المعالجة الوقائية بالمضادات الحيوية ، لمعالجة حالات التهاب الملتحمة</p>	<p>اوبتيدكس ت Optidex T</p>	<p>Tobramycin + Dexamethasone</p>
<p>لا يعطى للذين لديهم حساسية من مضادات الالتهاب الغير ستيرويدية ، لا ينصح للحوامل والمرضعات وكذلك الأطفال دون 10 سنة</p>	<p>يستعمل للإزالة المؤقتة للحكة العينية الناجمة عن التحسسي الموسمي للملتحمة ، لعلاج التهاب التالي للعمليات عند المرضى الذين أجريت لهم عملية استخراج الساد</p>	<p>اوبتيلار Optilar</p>	<p>Ketorolac tromethamine + Benzalkonium chloride + Edetate disodium + Octoxynol + Sodium chloride</p>










			
بعد التداخلات الجراحية ، لا يستعمل أثناء الحمل ، يستعمل تحت إشراف طبي أثناء الإرضاع ، لا يستعمل على مدى فترات طويلة	مزيل احتقان الأنف ، للمساعدة في تصريف الإفرازات الأنفية ، إزالة احتقان الغشاء المخاطي للبلعوم ، تسهيل تنظيف الأنف	أوتريفين Otrivin 	Xylometazoline HCL + Benzalkonium chloride + Sodium phosphate + Sodium chloride + Methylhydroxypropylcellulose
التهاب القرنية ، وامرض فيروسية أخرى للقرنية والملتحمة ، إصابة العين بالمتفطرات ، داء فطريات العين ، في الحمل والإرضاع للضرورة	في حالات التهاب العين ، وفي حالات التهاب العنبية المزمن وجروح القرنية الناتجة عن حروق كيميائية أو اختراق أجسام غريبة.	د.ن.ب P.N.D 	Dexamethasone + Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate
يعطى بحذر للمرضى المصابين بأمراض القلب ، الكبد ، الاضطرابات النفسية ، القرحة المعدية ، لا يعطى للحوامل	الاضطرابات الغدية المترافقة مع ارتفاع بروتاكتين الدم ، العناية والعقم عند الرجال ، متلازمة المبيض متعدد الكيسات ، الطمث ، الم واحتقان الثدي ، لمعالجة داء باركنسون	بارلوديل Parlodel رونالين Ronali 	Bromocriptine 
يمنع استعماله في أماكن الإصابة في جفن العين أو بالقرب من العين	يستخدم في علاج التهابات الجلدية التي تصاحبها أحمرار لطبقة الجلد مثل الأكزيما كما يستعمل في علاج الحساسية والحكة (الهرش) الجلدية والتهاب الجلد بالتماس والتهاب الجلد الاستشراني.	بيتاديرم مرهم Betaderm Ointment 	Betamethasone 
لا يستعمل بحالة فطريات الجلد.	يستعمل للحساسية والالتهابات الجلدية	بتنوفيت Betnovate N	Betamethasone + Neomycin

			
تجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول ، يعطى بحذر لأمراض الكبد/ مرض كلوي سوء التغذية ، الحمل الفئة B	مسكن للآلام خافض للحرارة	براسيتول Paracetol 	Acetaminophen  acetaminophen
يستخدم أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة من الزمن في الحالات التالية : الأطفال الأمراض المزمنة الحمل فئة C	تستخدم في طائفة واسعة من الأمراض / التهابي ، الحساسية ، الأورام ، حالات الربو	بردنزلون Prednisolone 	Prednisolone 
لا توجد موانع	يستخدم في تسكين الآلام المؤقت كآلام الأسنان او بسبب إصابة ما كلاعب الكرة في المباراة ، في حالات تسكين الآلام قبل العمليات الجراحية	بخاخ ليدوكاين Lidocaine Spray 	Lidocaine 
لا يستعمل للحوامل والمرضعات.	أعراض تضخم البروستات الحميد ، ارتفاع ضغط الدم الخفيف أو المعتدل	بروستا نور Prosta-nor 	Terazosin hydrochloride 
لا يعطى مع المسكنات الأخرى ، حالات القرحة ، مرضى الكلى الحمل الفئة B ، في الثلث الأول	مسكن للآلام ، التهاب المفاصل ، هشاشة العظام ، خفض الحمى	بروفين Brufen	Ibuprofen











			
يمنع استخدامه إذا كان المريض يعاني من قرحة ، مرضى الكلى، يجب استشارة الطبيب في حالة مرضى القلب ،يمنع على الاطفال الاقل من 6 شهور،	يستخدم في تسكين الالام المفاصل والعظام ويعالج حالات الالام الاسنان والتهاب اللثة ،خافض للحرارة سريع المفعول وكمسكن للالام الطمث اثناء الدورة الشهرية.	أدفيل Advil 	Ibuprofen 
لا يستعمل خلال الحمل والإرضاع.	البواسير الشرجية والحكة والألم والحرقة المرافقة لها	بروكتوسيديل Proctosedyl 	Cinchocaine HCL + Hydrocortisone
لا يستخدم للأطفال اقل من سن الثالثة	مسكن للسعال ومذيب للبلغم	بلسم Balsam 	Guava leaf extract + Thyme leaf extract + Tilia flower extract + Honey + Fennel oil.
لا يوصف للمرضى الذين يعانون من قصور شديد في وظيفة الكليتين ، ولا يوصف في التهاب الأمعاء أو قرحة الأمعاء وقرحة المعدة ، لا يستعمل عند الإرضاع . الحمل فئة C	لتخفيف الألم البسيط أو المتوسط الشدة وحالات الصداع	بونستان Ponstan 	Mefenamic acid 
أمراض القناة الهضمية الانسدادية.	المغص المعوي والمعدي ، تقلص فتحتي البواب والفؤاد بالمعدة ، القيء	سبازتولين Spastolin	Pipenzolate methyl bromide + Phenobarbital









			
<p>التهاب الجلد حول الفم ، الإصابة الجرثومية لقشرة الرأس ، الإصابة الجلدية الفيروسية ، يستعمل بحذر في الإرضاع ، لا يستعمل في الحمل</p>	<p>لمعالجة الصدفية والإصابات الجلدية المتقرنة</p>	<p>بيتا ساليك Beta-salic</p> 	<p>Betamethasone + Salicylic acid</p>
<p>القرحة المعوية العفجية ، يحذر إعطاء هذا الدواء عند مرضى الربو والحوامل</p>	<p>المعالجة العرضية للدوار أدهليزي ، لمعالجة داء منيير (دوار ، طنين ، غثيان)</p>	<p>بيتاسيرك Rabestine</p> 	<p>Betahistine dichlorhydrate</p> <chem>CN(C)CCc1cccnc1.Cl</chem>
<p>يعطى بحذر في حال وجود الجلوكوما ، احتباس بولي ، لا يستعمل أثناء الحمل والإرضاع</p>	<p>للمعالجة الوقائية للصداع الوعائي المنشأ المتكرر بما فيه الشقيقة والصداع النصفي ذو المنشأ العصبي</p>	<p>بيزوفين Pizofen</p> 	<p>Pizotifen</p> <chem>CN1CCN(C1)C2=CC=C3C(=C2)C(=C4C=CC=CC=C4)C=C3S</chem>
<p>لا يستعمل عند المرضى الفشل القلبي الحاد، انسداد شديد في الجهاز التنفسي، بطء قلبي واضح ، الحذر عند الإعطاء للأمهات المرضعات الحمل فئة C</p>	<p>دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، الذبحة الصدرية ، ويستخدم لعلاج انتظام ضربات القلب ، الفشل القلبي</p>	<p>كونكور Concor</p> 	<p>Bisoprolol</p> <chem>CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)COCCOC(C)C</chem>
<p>في حالة القصور الكبدي او الكلوي ، يجب استشارة الطبيب للحوامل والمرضعات</p>	<p>الآلام وإزالة التشنجات وتخفيض الحرارة ، الصداع . ألم الأسنان ، آلام عسر الطمث</p>	<p>دي انتالفك DI-Antalvic</p> 	<p>Dextropropoxyphen e + Paracetamol</p>
<p>لا يستعمل عند وجود إصابات جلدية جروح أو التهاب . لا يستعمل عند</p>	<p>لمعالجة حب الشباب (العد).</p>	<p>بانوكسيل PanOxyl</p>	<p>Benzoyl Peroxide</p>









الحمل أو المرضع أو الأطفال دون سن الثانية عشر إلا باستشارة الطبيب			
يعطى بحذر للذين يعانون من أمراض القلب والسكري والجلوكوما والمسنين ، الحمل فئة C	موسع للشعب الهوائية عند نوبات الربو والأمراض الأخرى	بيوتادين Butadiene فنتولين ventolin	Salbutamol
			
يعطى بحذر في حالات أمراض الكبد والنقرس ، احتباس البول ، ضعف السمع ، انخفاض ضغط الدم ، داء السكري ، لا يعطى في الجفاف ، الأطفال دون 10 سنة ، الحمل فئة C	مدرر للبول ، إزالة السوائل الزائدة في الجسم ، وفي حالات زيادة السوائل واحتباسها في الجسم ، يستخدم أيضا لعلاج ارتفاع ضغط الدم	بيورنيكس Burinex	Bumetanide
			
مرض في الجهاز التنفسي مثل الربو ، أمراض معينة في القلب ، اضطرابات كلوية شديدة ، لا يجوز الاستعمال أثناء الحمل والإرضاع وللأطفال	لخفض الضغط المرتفع في العين ومعالجة الزرق	تيمودور Timodor	Dorzolamide hydrochloride + Timolol maleate
			
لا يعطى في وذمة رئوية ، صدمة قلبية ، بطء القلب أو إحصار القلب ، يعطى بحذر في اختلال كبدى أو كلوي والمسنين ومرض رنوي وداء السكري ، الحمل والإرضاع والأطفال لا يعطى	لعلاج ارتفاع ضغط الدم ،لتخفيف آلام الذبحة الصدرية ويستخدم لتنظيم ضربات القلب وللرجفة	تينورمين Tenormin	Atenolol
			
لا يستعمل بحالة ارتفاع عمل الغدة الدرقية ، أمراض القلب ، وبحالة الحمل فلا بد من تغيير الجرعة	يستخدم لمرضى انخفاض عمل الغدة الدرقية والأورام الحميدة لهذه الغدة ، ويستخدم بحالة الأورام السرطانية	ثايروكسين L-Thyroxin	Levothyroxine sodium







لأنه تزداد الحاجة لهورمونات الغدة الدرقية	للغدة الدرقية بعد خضوع المريض للجراحة		
لا ينصح هذا الدواء للأطفال والمراهقين دون 18 سنة من العمر	يستخدم لمعالجة الصرع ، الألم العصبي	ليريكا Lyrca 	Pregabalin 
لا يعطى في حالات الالتهاب الحاد في البنكرياس ، تخفيض الجرعة لدى المصابين في قصور وظائف الكلى ، الحمل والإرضاع للضرورة القصوى	لعلاج آلام الاعتلال العصبي لدى البالغين ، كعلاج منفرد أو إضافي في الصرع	جابا تركس Gabatrex 	Gabapentin 
في حالة القصور الكبدي او الكلوي ، لا يعطى للحوامل	علاج داء السكري نوع الثاني	اماريل Amaryl 	Glimepiride 
لا توجد موانع	لمعالجة السعال.	جوافلكس Guaflex 	Guava leaves + Tilia Flowers + Fennel oil
لا توجد موانع	الخدوش ، الجروح القطعية أو تهتكات الجلد ، العمليات الجراحية (بما في ذلك بعد عمليات الولادة القيصرية)،	جل كونتراكتيوبوكس Contractubex	Obtained from onions + Heparin + Allantoin










	الحروق أو السفعات ، العلاج بالليزر (مثل إزالة الوشم)		
ينصح بإيقاف الإرضاع أثناء أخذ العلاج ، يعطى للحوامل	نقص البروجيستيرون مثل :آلام الطمث ، داء البطانة الرحمية ، انقطاع الطمث الثانوي ، عدم انتظام الدورة ، العقم ، الإجهاض المكرر المصحوب بنقص البروجيستيرون.	دوفاستون Duphaston 	Dydrogesterone 
يعطى بحذر في اختلال كلوي أو كبدي ، الوهن ، يمنع استخدامه أثناء الحمل ، الأطفال دون سن الثامنة	علاج حب الشباب ، علاج الجمرة الخبيثة ، علاج السيلان ، علاج الزهري	دوكسيسايلين Doxycycline 	Doxycycline 
يمنع استخدامه مع السلفا (سبترين أقراص)	يستخدم التخلص من زيادة املاح اليورات urate في الجسم ، طرد الحصوات الموجودة في الجهاز البولي ، مطهر لمجري البول urinary tract الذي قد تصيبه البكتريا في حالة زيادة املاح ال urate لانها تجعل مجرى البول مكان مناسب لنمو البكتريا	بروكسيمول Proximol 	Halfa bar + hexamine +piperazine
قصور وظائف الكبد حيث تنتج الامونيا من تحلل الهكسامين وحالات الفشل الكلي والجفاف الشديد	يستخدم في التهابات المسالك البولية وللقضاء علي بلورات الاملاح (اليورات) Urate الزائدة في البول لأن أهمالها يسبب حصوات بالكلية والحالب.	جدكورين فوار Jedcorene 	Piperazine + Hexamine+ Khellin
قصور وظائف الكبد حيث تنتج الامونيا من تحلل الهكسامين وحالات الفشل الكلي والجفاف الشديد	يستخدم في التهابات المسالك البولية وللقضاء علي بلورات الاملاح (اليورات) Urate الزائدة في البول لأن أهمالها يسبب حصوات بالكلية والحالب	يوريكول فوار Uricol 	Piperazine + Hexamine+ Khellin










يعطى بحذر للمرضى المسنين	علاج ارتفاع ضغط الدم يعتبر الخيار الاول للمرأة الحامل.	الدوميت Aldomet 	Methyldopa 
يجب اخذ الحذر عند المرضى المصابين بقصور كبدي معتدل أو شديد أن لا يزيد الجرعة اليومية عن 8 ملغم الحمل فئة B	للقاية والعلاج من الغثيان الذي تسببه المواد الكيميائية ، للقاية والعلاج من الغثيان والاقياء بعد التداخلات الجراحية	دي فوميت De-vomit 	Ondansetron HCL 
يستخدم أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة من الزمن في الحالات التالية : الأطفال الأمراض المزمنة. الحمل فئة C	تستخدم في طائفة واسعة من الأمراض / التهابي ، الحساسية ، الأورام ، وحالات الربو	ديوميدول Depo-medrol 	Methylprednisolone 
يستخدم أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة من الزمن في الحالات التالية : الأطفال الأمراض المزمنة . الحمل فئة C	في طائفة واسعة من الأمراض المزمنة بما في ذلك : التهابي ، الربو ، الحساسية ، الدموية ، الأورام	ديكارون Decadron دكسون Dexon 	Dexamethasone 
لا توجد موانع.	لمعالجة انتفاخ البطن ، لطرذ الغازات والهواء من القناة الهضمية	ديميثيكون Dimethicone 	Dimethicone 
لا توجد موانع	يستخدم ميبو اصلاح الحرق مرهم لجميع الحروق بما في ذلك حروق الشمس ، و طفح الحفاض ، طفح العرق ، تقرحات السكري،	ميبو MEBO	B-sitosterol,sesame oil ,bees wax






			
يجب اخذ الحذر مع المرضى المصابين بقصور حاد في وظائف الكبد ، لا يعطى للحوامل والمرضعات	علاج قرحة الاثنى عشر والمعدة ، علاج التهاب المريء الارتجاعي ، التهاب وقرحة الجهاز الهضمي.	رابيزول Rabezole 	Rabeprazole 
لا يستعمل في نوبات الربو الحادة الإرضاع، انسداد عنق المثانة، أعراض تضخم البروستات	مضاد للحساسية.	اليرمين Allermine 	Chlorpheniramine maleate 
عدم الاستعمال في حالات المغص الشديد وحصر البول ، لا يستعمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل	لعلاج المغص الكلوي ، وعلاج الالتهاب المرافق للحصى الكلوي ، ويساعد على تذويب وطرده الحصى	رواتينكس Rowatinex 	Pinene + Camphene + Borneol + Anethol + Fenchone + Cineol + Olive oil
اضطراب في وظيفة الكلية والكبد ، يستعمل للضرورة أثناء الحمل والإرضاع	معالجة ارتفاع حمض البول ، اعتلال الكلية اليوراتي ، النقرس	زيلوريك Zyloric 	Allopurinol 
لا يعطى خلال الحمل والإرضاع.	علاج سرطان الثدي بعد الجراحة والأشعة ، معالجة مرافقة لسرطان الثدي المتقدم	زيموبليكس Zymoplex	Tamoxifen citrate












			
يمنع لمن لديهم اضطرابات في الأوعية الدموية المحيطية ، داء القلب التاجي ، فرط ضغط الدم ، الحمل والإرضاع ، حالات قصور الكبد والكلى	لمعالجة الشقيقة الحادة كما يستعمل لمعالجة أنواع أخرى من الصداع.	ميغرين ساندو Sandu Migrain آسيا ميغرين Asia Migrain 	Ergotamine tartrate + Caffeine
يستعمل بحذر في حالة الصرع ، الوهن العضلي . لا يستعمل في حالات: الاطفال والمراهقين دون 18 عاماً ، الحمل والإرضاع	التهاب البروستات ، التهابات المجاري البولية ، حمى التيفوئيد ، الجمرة الخبيثة	سيبرودار Ciprodar 	Ciprofloxacin 
لا ينصح بإعطائه للحوامل بدون استشارة الطبيب ، عند المصابين بهبوط التوتر الشرياني	معالجة اضطرابات الدورانية الدماغية ، اضطرابات التوازن ، معالجة الشقيقة	ستاجيرون Stugeron 	Cinnarizine 
يمنع تناوله اثناء الحمل ، يمنع استخدام في حالة الرضاعة الطبيعية لانه يوقف انتاج الحليب من الثدي	يستخدم لمنع الحمل	مارفيلون Marvelon 	Desogestrel + Ethinyl Estradiol










<p>لتهاب الوريد الخثاري أو اضطرابات انصمامية خثارية ، أمراض الشرايين التاجية أو الأوعية الدموية الدماغية، ارتفاع ضغط الدم الشديد ، أورام الكبد ، الحمل ، مرض السكري مع إصابة الصمامات.</p>	<p>يستخدم لمنع الحمل</p>	<p>ياسمين Yasmin</p> 	<p>Drospirenone + Ethinyl estradiol</p>
<p>يمنع استخدامه في حالات الانسداد التجلطي أو تجلط الدم أو في حالات وجود مرض السكري كما يمنع استخدامه لمن تعاني من صداع نصفي</p>	<p>يستخدم لمنع الحمل</p>	<p>جينيرا Gynera</p> 	<p>Ethinylestradiol + Gestodene</p>
<p>لا يعطى في أمراض الكبد ، أمراض القلب والأوعية الدموية ، الجلوكوما ، يعطى ، بحذر في داء السكري ، أمراض الجهاز التنفسي ، تضخم البروستات ، أورام الجهاز العصبي المركزي ، صرع ، انسداد معوي ، الحمل فئة C</p>	<p>علاج الذهان الحاد والمزمن ، مساعد في إدارة القلق</p>	<p>ستلازين Stelazine</p> 	<p>Trifluoperazine HCL</p> 
<p>يجب إنقاص الجرعة للمرضى المصابين بخلل كلوي شديد ، يجب أخذ الحذر عند استعماله لحديثي الولادة المصابين باليرقان ، يجب أخذ الحذر عند استعماله للنساء الحوامل والمرضعات ، يجب عدم الاستعمال مع المحاليل المحتوية على الكالسيوم حيث يتسبب ذلك في حدوث آثار جانبية مميتة.</p>	<p>التهابات الجهاز التنفسي ، التهابات الجلد ، التهابات المسالك البولية ، داء السيلان ، تسمم الدم الجرثومي ، التهابات أغشية البطن ، التهاب السحايا ، التهاب الأذن الوسطى الحاد ،</p>	<p>سفترايكون Ceftriaxone</p> 	<p>Ceftriaxone</p> 
<p>يعطى بحذر في قرحة</p>	<p>مقشع ومذيب للإفرازات ،</p>	<p>برومهيكسين</p>	<p>Bromhexine HCL</p>







<p>المعدة ، ينصح بعدم استعماله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، أما خلال الإرضاع للضرورة فقط</p>	<p>تخفيف الأعراض المصاحبة للالتهابات القصبية الشعبية</p>	<p>Bromhexine</p> 	
<p>يعطى بحذر في أمراض الجهاز التنفسي ، في الحمل والإرضاع ، أمراض القلب ، ارتفاع ضغط الدم ، الغدة الدرقية ، داء السكر ، القرحة انسداد الأمعاء</p>	<p>مسكن للألام العضلي/ المفاصل ، الصداع/ الأسنان ، التشنج العضلي</p>	<p>سيدافيد بلس Siidafed plus</p> 	<p>Paracetamol + Tramadol + Diclofenac sodium</p>
<p>لا يعطى في حالات مرض كبدى شديد ، البورفيريا ، يعطى للحوامل للضرورة فقط</p>	<p>لعلاج جميع أشكال الصرع</p>	<p>ديباكين Depaken</p> 	<p>Valproate sodium</p> 
<p>يعطى بحذر للمرضى الذين لديهم خلل في وظائف الكبد ، اختلال كلوي حاد المسنين أو المرضى بالوهن والأطفال ، لايعطى للحوامل</p>	<p>مهدئ حالات الهستيريا والتشنج ، ارتخاء العضلات ، القلق</p>	<p>فاليوم Valium</p> 	<p>Diazepam</p> 
<p>عدم انتظام ضربات القلب غير المنضبط ، فرط الدرقية . ، يعطى بحذر للمرضى المسنين فوق 61 سنة ، الحمل فئة C</p>	<p>حالات ضيق التنفس والربو انسداد مجرى الهواء الناجم عن انعكاس أو الربو المزمن</p>	<p>فايلوكونتين Phyllocontin</p> 	<p>Aminophylline</p> 
<p>يستعمل بحذر كبير عند المرضى المصابين باضطرابات دموية أو أمراض فعالة في الجملة العصبية يمنع للحوامل في</p>	<p>داء الأميبة المعوي والكبدى ، إسهال ، وفي الإصابة بالجراثيم اللاهوائية ، داء الجيرادات.</p>	<p>فلاجيل Flagyl</p>	<p>Metronidazole</p>

<p>فترة الثلاث شهور الأخيرة من الحمل , لا يتسعمل فلجيل أثناء فترة الرضاعة</p>			
<p>لا يعطى في حالة القرحة ، ولا يعطى في الإرضاع ، يعطى بحذر في أمراض القلب ، الاختلال الكلوي ، الحمل والأطفال لم تثبت السلامة</p>	<p>حالات متعددة التي تتطلب تأثير مضاد للالتهابات/أو تأثير مسكن ،التهاب المفاصل ، هشاشة العظام</p>	<p>فلدين Feldene</p> 	<p>Piroxicam</p> 
<p>لا يستعمل لمعالجة التهابات القرنية الناجمة عن الهريز سمبلكس السطحي ، تدرن العين ، لا ينصح في الحمل</p>	<p>معالجة التهابات الجفن وبصلة الملتهمة وقرنية العين الجزء الأمامي من الكرة.</p>	<p>فلوكا Fluca</p> 	<p>Sodium cromoglicate + Fluorometholone</p>
<p>يعطى بحذر في حالات أمراض الكبد أو الكلى ، لا يعطى للأطفال وخلال الإرضاع والحمل</p>	<p>معالجة العدوى الفطرية التي تسببها الكائنات الحساسة ، المبيضات ، التهابات المسالك البولية ، التهاب الصفاق ، التهاب السحايا المستشفيات الوقاية من داء المبيضات</p>	<p>ديفلوكان Diflucan</p> 	<p>Fluconazole</p> 
<p>لا يستعمل للرضع في الأشهر الأولى من الولادة ، الخدج ، لا يستعمل أثناء الحمل</p>	<p>لمعالجة الحروق والتقرحات الجلدية</p>	<p>فلوميزين Floumizin همازين Hmazzin</p> 	<p>Silvers Sulphadiazine</p> 
<p>حساسية من المادة</p>	<p>يستخدم لعلاج التهاب و تضخم البروستات</p>	<p>بروستامول اونو prostamol uno</p>	<p>serenoa repens</p>











			
لا يعطى في حالات قصور الكلوي ، الحمل والإرضاع ، اختلال المريء	العلاج والوقاية من مرض هشاشة العظام في النساء بعد سن اليأس ، علاج ترقق العظام لدى الرجال ، علاج مرض باجيت للعظام	Fosamax فوزماكس Oste اوستي	Alendronate 
لا يستعمل في حالات القصور الكلوي الشديد ، الرضع وحديثي الولادة الحمل فئة C	المعالجة العرضية لفرط الحموضة ، المعالجة العرضية لعسر الهضم وحرقة الفؤاد	Gastrogel كاستروجيل anti acid أسيد انتي	Mg. trisilicate + Al. hydroxide gel
يجب اخذ الحذر في حالة أمراض الكبد لا يعطى في الحمل والإرضاع والأطفال دون 10 سنة إلا للضرورة القصوى	قرحة الاثني عشر النشطة ، القرحة المعديّة ، القرحة المعديّة الحميدة النشطة ، داء الجزر المعدي المريئي ، التهاب المريء الناتج عن عملية التنظير ، كما يستخدم كجزء من العلاج المتعدد الأدوية لاستئصال الـ H.Pylori (الملوية البوابية)	كاسك Gasec اوميرازول Omeprazole	Omeprazole 
يجب اخذ الحذر في حالة أمراض الكبد لا يعطى في الحمل والإرضاع والأطفال دون 10 سنة إلا للضرورة القصوى	قرحة الاثني عشر النشطة ، القرحة المعديّة ، القرحة المعديّة الحميدة النشطة ، داء الجزر المعدي المريئي ، التهاب المريء الناتج عن عملية التنظير ، كما يستخدم كجزء من العلاج المتعدد الأدوية لاستئصال الـ H.Pylori (الملوية البوابية)	رايسك Risek	Omeprazole 
فرط الحساسية للمادة الفعالة التي يحتويها بروكتو جليفينول	يستخدم لعلاج البواسير	بروكتو جليفينول procto glyvenol	Tribenoside + lidocaine

			
تجنبها في المرضى الذين يعانون من التعصب ، في حديثي الولادة ، يحذر للأشخاص لديهم ضعف السمع ، والأطفال الخدج ، السمنة المرضى / .الرضاعة ، والرضع وحديثي الولادة (لم يثبت سلامة) الحمل فئة C	علاج الالتهابات الجرام سلبية خطيرة العصوي والالتهابات التي تسببها العنقوديات عند موانع بنسليات أو غيرها من المخدرات أقل سمية	كراميسين Garamycin 	Gentamicin 
لا ستعمل في الحالات الجلدية الالتهابية الحادة	مضاد للحكة (كافة أنواع الحكة) ، وفي الجرب	يوراكس Eurax 	Crotamiton 
بالنسبة للحمل فئة B ، يجب توخي الحذر عند الإعطاء للام المرضعة	التهاب المسالك البولية/ التهاب الجلد/ التهاب الحلق واللوزتين	سيفادروكس Cefadrox 	Cefadroxil 
في حالة الفشل الكلوي يجب أن تحدد الجرعة بدقة ، (الحمل فئة B) .	التهاب الجهاز التنفسي ، التهاب اللوزتين ، التهاب الجيوب الأنفية ، التهاب الأذن الوسطى ، التهاب المسالك البولية والتناسلية ، التهاب البروستات ، التهاب الجلد والأنسجة	كفلكس Keflex 	Cephalexin 
يعطى بحذر لدى المرضى المصابين بأمراض في الجهاز الهضمي ، في الحمل والإرضاع للضرورة فقط	التهابات الجهاز التنفسي السفلي ، الالتهابات البولية والتناسلية ، تجرثم الدم ، التهابات الجلد والأنسجة ، التهابات داخل البطن ، السحايا.	كلافوران Claforan 	Cefotaxime 
أمراض الكبد ، سرطان البطانة	في معالجة العقم الناجم عن غياب الإباضة أو خلل	كلوميد Clomid	Clomiphene Citrate









<p>الرحمية ، الكيسات المبيضية الحمل والإرضاع</p>	<p>الاباضة.</p>	<p>Clomid® 50mg Tablets Clomifene Citrate For oral use 30 tablets sanofi aventis</p>	
<p>يعطى بحذر لمرضى الضغط الدم المرتفع, لا يستعمل نوبات الربو. الزرق ضيق الزاوية. أعراض تضخم البروستات, الغدة الدرقية , الحمل فئة C</p>	<p>ارتفاع درجة الحرارة والصداع المصاحب للزكام ونزلات البرد الحادة، إحتقان الأنف وإحتقان الجيوب الأنفية وآلامها، رشح الأنف والعطس وحكة الأنف والحنك.</p>	<p>كونجيسنال Congestal</p> 	<p>Paracetamol + pseudoephedrine hydrochloride + chlorpheniramine maleate</p>
<p>يعطى بحذر لمرضى الضغط الدم المرتفع, لا يستعمل نوبات الربو. الزرق ضيق الزاوية. أعراض تضخم البروستات, الغدة الدرقية , الحمل فئة C</p>	<p>ارتفاع درجة الحرارة والصداع المصاحب للزكام ونزلات البرد الحادة، إحتقان الأنف وإحتقان الجيوب الأنفية وآلامها، رشح الأنف والعطس وحكة الأنف والحنك.</p>	<p>كولد فري cold free</p> 	<p>Paracetamol + Pseudoephedrine hydrochloride + Chlorpheniramine maleate</p>
<p>لا يستعمل في حالات القصور الكلوي , القصور التنفسي أو الكبدي ، وحدوث جفاف ، قصور القلب للحوامل غالبا غير مستخدم لم تجري ابحاث كافية على نساء الحوامل</p>	<p>علاج داء السكر من النوع الثاني ، وكعلاج مساعد لمرضى داء السكري المعتمدين على الأنسولين</p>	<p>كلوكوفج Glucophage</p> 	<p>Metformin</p> 
<p>يعطى بحذر في حالات القصور الكلوي أو الكبدي ، الحمل فئة C في الأشهر الثلاثة الأولى وفئة D في الأشهر الأخيرة للحمل</p>	<p>في معالجة ارتفاع الضغط الشرياني يستخدم بمفرده أو مع خافضات أخرى</p>	<p>دايوفان Diovan</p> 	<p>Valsartan</p> 
<p>القصور الكلوي، التهاب الكبد الشديد ، لا يستعمل في الحمل إللا للضرورة</p>	<p>لإزالة الألم والشعور بالحرقان والأعراض الأخرى التي تنشأ عن تهيج الغشاء المخاطي للجزء السفلي من الجهاز البولي المتسبب عن العدوى بالميكروبات</p>	<p>يوريسبت Urisept</p> 	<p>Phenazopyridine HCL</p> 








لا توجد حيث أنه لا يمتص ولا يصل إلى الدم وتأثيره موضعي	علاج الإلتهابات الفطرية بالفم والبلعوم	ميكوناز جل Miconaz Oral Gel	 Miconazole
لا يستعمل في حب الشباب ، وردية ، الوجه ، الحكة الشرجية ، لا يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى	لمعالجة المناطق الجلدية مفرطة التقرن مثل الاكزيما المزمنة ، الحزاز البسيط ، الطفح الجلدي والصدفية	إليكا سال Elicasal	 Mometasone Furoate + Salicylic acid
يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى	في حالات الإلتهابات الجلدية والحكة المصاحبة بعدوى فطرية	إليكا-م Elica M	 Mometasone Furoate + Miconazole Nitrate
لا يستعمل في حب الشباب ، وردية ، الوجه ، التهابات ما حول الفم ، يستعمل في الحمل والإرضاع إلا للضرورة القصوى.	حالات الإلتهابات الجلدية والحكة مثل الصدفية والتهابات سطحية، والاكزيما	إليكا Elica	 Mometasone Furoate
لا يعطى لمرضى القصور الكبدى او الكلوي ، لا يعطى خلال الحمل ، يعطى بحذر اثناء الارضاع وكذلك لكبار السن	معالجة امراض القولون القرحية الحادة والوقاية من الاندفاعات النزفية المتطورة بدءا من القولون حتى الشرج	ميزا كول Mesacol	 Mesalazine
لا يعطى في حالات القرحة ، يعطى بحذر في حالات امراض القلب الوعائية والكلية والكبدية والحمل والرضاعة أو الأطفال اقل من 1 سنة.	مسكن ألم ، للحمى ، عسر الطمث ، التهاب المفاصل الروماتزم ، هشاشة العظام ، النقرس الحاد	أليف Aleve	 Naproxen






<p>الاستعمال المطول لهذه القطرات يؤدي الى احداث اذى كبير للاغشية المخاطية مما يؤدي الى انسداد الانف .</p>	<p>يعطى في حالة انسداد الانف</p>	<p>نازوفرين Nasophrine</p> 	<p>Naphthazoline nit. + Phenylephrine HCL + Chlorbutol</p>
<p>لا يعطى للرضع دون الثلاثة أشهر ، والحوامل ، وخلال الإرضاع ، يعطى بحذر للمرضى المصابين بقصور في وظائف الكلية أو الكبد.</p>	<p>معالجة التهابات الجهاز البولي السفلي ، معالجة الزحار العصوي ، إسهال حاليا لا يستخدم الا القليل لكثرة اثاره الجانبية</p>	<p>ناليدكسيك اسيد Nalidixic acid</p> 	<p>Nalidixic acid</p> 
<p>يعطى بحذر في الاعتلال الكلوي، والكبدى الشديدين، التهاب في الأوتار ، الصرع واضطرابات الجملة العصبية المركزية وعند كبار السن ، لا يستعمل عند الأطفال والمرضعات الحوامل</p>	<p>التهابات الكلية والمجاري البولية ، السيلان ، أيضا لعلاج التهاب البروستات.</p>	<p>نورفلوكس Norflox</p> 	<p>Norfloracin</p> 
<p>يستخدم بحذر عند مرضى الربو أو الجلوكوما أو توسع غدة البروستات ، لا ينصح للأطفال دون 10 سنة ، الحمل فئة B</p>	<p>الدوخة والاقياء الناتج عن الحمل.</p>	<p>نافيدوكسين Navidoxine</p> 	<p>Meclizine HCL + Vitamin B6</p>
<p>لا يعطى في : قرحة المعدة . يعطى بحذر في الربو ، أمراض المعدة ، فشل الكبد والكلية ، أمراض القلب عجز القلب ، ارتفاع ضغط الدم ، الحمل خاصة الأشهر الثلاثة الأخيرة</p>	<p>مسكن للآلام وخافض للحرارة</p>	<p>نو بين No pain</p> 	<p>Paracetamol + Ibuprofen + Caffeine</p>
<p>يعطى بحذر لمرضى السكري الحمل فئة B</p>	<p>الأمراض المسببة بالفطور الخميرية ، داء المبيضات الذي يصيب الأغشية المخاطية ، يستعمل لمنع تطور داء المبيضات خلال المعالجة الطويلة</p>	<p>نيستاتين Nystatin</p>	<p>Nystatin</p>







	بالمضادات الحيوية		
لا يستعمل عند وجود التهابات فيروسية موضعية أو جهازية ، لا يستعمل خلال الحمل ، يعطى بحذر للأم المرضعة	مضاد جرثومي ، مضاد فطري مضاد للالتهابات واسع الطيف	نيستاغرام Nystagram 	Triamcinolone acetoneide + Gramicidine + Neomycin + Nystatin
يعطى بحذر في حالات أمراض الكبد ، النقرس داء السكري ، الأطفال دون 10 سنة ، الحمل فئة C	مدر للبول عند ارتفاع ضغط الدم ، علاج تجمع السوائل (الوذمة) المرتبطة بقصور القلب الاحتقاني	لازكس Lasix 	Furosemide 
يمنع في حالات ارتفاع الجالاكتوز في الدم	لمعالجة الإمساك ، مرضى اعتلال الدماغ الكبدي	لاكتولاك Lactolac 	Lactulose 
لا يعطى في حالات وجود ألم بطني حاد ، التهاب زائدة ، نزف شرجي ، التهاب المعدة والأمعاء ، انسداد معوي ، الحمل فئة B	لمعالجة الإمساك	لاكسدل Laxadyl بسكوديل Bisacodyl 	Bisacodyl 
إذا كان للمريض حساسية لعنصر لانزوبرازول يمنع الاستخدام	التهابات المعدة والاثني عشر والقرحة والحرقة	لانزور Lanzor 	Lansoprazole





<p>إذا كان للمريض حساسية لعنصر إيسوميرازول يمنع الاستخدام</p>	<p>علاج قرحة الاثني عشر النشطة أو الملتئمة</p>	<p>نيكسيوم NEXIUM</p> 	<p>Esomeprazole</p> 
<p>يعطى بحذر في الجلوكوما ، ارتفاع ضغط الدم الوهن العضلي ، التهاب القولون التقرحي ، أمراض الكبد والكلية والربو ، لا يعطى خلال الحمل والإرضاع</p>	<p>يمنع تقلصات عضلات جدار الأمعاء ، تخفيف من إنتاج حمض المعدة</p>	<p>لبراكس Librax</p> 	<p>Chlordiazepoxide + Clonidine bromide</p>
<p>الانتفاخ البطني ، داء الأمعاء الالتهابي الحاد ، لا ينصح للرضع ، التهاب القولون المرافق للمضادات الحوية</p>	<p>مضاد للإسهال.</p>	<p>لوبرمايد Loperamide</p> 	<p>Loperamide HCL</p> 
<p>الحساسية للمادة</p>	<p>يستخدم للسعال الجاف</p>	<p>ساينيكود Sinecod</p> 	<p>Butamirate citrate+ manilyn saccharin sodium</p>
<p>لا توجد موانع</p>	<p>التهاب الشعب الهوائية وعلاج الكحة</p>	<p>كيفبان Kifpan</p> 	<p>Dried ivy leaf extract</p>
<p>لا يعطى في حالات الصدمة القلبية ، قصور القلب ، حصار القلب بطء ، القلب الجيبي ، يعطى بحذر للحوامل والمرضعات وتحت إشراف</p>	<p>الذبحة الصدرية ، ارتفاع الضغط الشرياني ، للوقاية من الشقيقة ، وكعلاج مساعد في فرط نشاط الغدة الدرقية ، تنظيم دقات القلب</p>	<p>لوبريسور Lopressor</p>	<p>Metoprolol</p> 

الطبيب		<p>NDC 0078-0458-05</p> <p>Lopressor® 50mg metoprolol tartrate USP</p> <p>100 tablets Rx only</p> <p>NOVARTIS</p>	
يحذر استخدام الدواء على الأطفال دون 6 سنوات وفي حالة القصور الكبدي والكلي	التهاب الأنف التحسسي ، التهاب الملتحمة ، الاضطرابات التحسسية الجلدية	<p>لوراتادين Loratadine</p> 	<p>Loratadine</p> 
يعطى بحذر لمرضى القصور الكبدي والكلي ، بالنسبة للإرضاع يجب إيقاف العلاج أو الإرضاع حسب أهمية العلاج للام ، لا يعطى للحوامل وخاصة بعد الأشهر الثلاثة الأولى	علاج ارتفاع التوتر الشرياني (علاج ضغط الدم) يستعمل لوحده أو بالمشاركة مع خافضات الضغط الأخرى	<p>لوزارتان Losartan</p> 	<p>Losartan potassium</p> 
التهاب القرنية الناتج من هربس سمبلكس ، التهاب الملتحمة والقرنية: فاكسينا ، فارسيلا / التهابات الفطرية	لعلاج التهابات ملتحمة العين والقرنية الجزء الأمامي من العين	<p>لوكسترا Loxtra</p> 	<p>Ofloxacin + Prednisolone acetate + Tetrahydrozolin HCL</p>
يجب تجنبه في حالة المرضى الذين يعانون من تضخم البروستات	حالات تهيج القولون	<p>ستلابيد Stelabid</p> 	<p>Isopropamide + Trifluoperazine</p>
حساسية مع المسكنات الأخرى ، اضطرابات النزف أو الصفحات ، يعطى بحذر في القرحة ، أمراض الكلى الشديدة أو كبدي حاد ، الحمل فئة D خلال الأشهر الثلاثة الأولى	التهاب المفاصل الروماتيزم ، هشاشة العظام ، ألم خفيف إلى معتدل ، حمى ، الوقاية من الذبحة الصدرية	<p>أسبرين Aspirin</p> 	<p>Acetylsalicylic acid</p> 
يجب أن لا يلامس العين والأنف و الأغشية	الانتانات الجلدية الفطرية المستجيبة للعلاج	<p>نيساكورت Nystacort</p>	<p>Dexamethasone + chlorhexidine HCl +</p>

<p>المخاطية, بحيث يجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد استعمال الكريم مباشرة. لا ينصح بالاستخدام الطويل وخصوصاً عند الأطفال ، يجب أن تطبق هذه المستحضرات أثناء الحمل عند الحاجة لها فقط بحيث أنها لا تطبق لفترة طويلة</p>	<p>بالستيروئيدات. التهاب الجلد بين الثنيات ، التهاب الحشفة والقلقة، التهاب الفم الزاوي، الأكزيما الدهنية (الزهمية)، الأكزيما التي تختلط بإصابة فطرية.</p>		<p>nystatin</p>
<p>الحساسية لأحد مكوناتها ، في حالة الحمل ،الإصابة بجذري الماء أو السل وجود الدوخة أو مشاكل سمعية ، عند وجود ثقب في طبلة الأذن</p>	<p>التهاب الأذن الخارجية والقناة السمعية بسبب جرثومي أو فطري ، تخفيف الحكة ، الحرقلة ، الحساسية.</p>	<p>أوتيك تري Tri – Otic</p> 	<p>Triamcinolon Acetonide + Neomycin sulfate + Gramicidin + Nystatin</p>
<p>يمنع استخدام في حالة الالتهابات الفيروسية الفطرية في الأذن كما يجب إعادة عن العين</p>	<p>الالتهابات البكتيرية في قناة الأذن الخارجية وخصوصا اذا كانت مصحوبة بألم.</p>	<p>أوتال Otal</p> 	<p>Framycetin+ Gramicidin+ Cinchocaine+ Dexamethasone</p>
<p>اضطرابات بصرية استشر الطبيب قبل استخدامه</p>	<p>عدم القدرة على الانتصاب (العجز).</p>	<p>فياجرا Viagra</p> 	<p>Sildenafil</p> 
<p>فنيستيل نقط امن بدرجة كبيرة ولا توجد موانع إستعمال له.</p>	<p>علاج الحكة والهرش والحساسية لأي سبب كان، حساسية الانف الموسمية وحمي القش</p>	<p>فنيستيل Fenistil</p> 	<p>Dimethindene Maleate</p> 
<p>وجود عدوى جرثومية فطرية أو فيروسية في الفم أو البلعوم لا يستعمل عند المصابين بالسل ،</p>	<p>مضاد للالتهاب ، الحكة ، الحساسية ، تقرحات الفم الناتجة عن الرضوض أو الجروح</p>	<p>دينتي كورت Denti-cort</p>	<p>Triamcinolone Acetonide</p>

<p>القرحة ،داء السكري ، أثناء الحمل إلا بعد استشارة الطبيب</p>			
<p>لا يعطى للأطفال ، يعطى أقل جرعة واقصر وقت في الحالات الآتية: أصحاب الأمراض المزمنة ، الإجهاد الجراحة ، والتهابات ، في الحمل لم يثبت سلامة</p>	<p>في طائفة واسعة من الأمراض المزمنة بما في ذلك : التهابي ، الحساسية ، الدموية ، الأورام ، اضطرابات المناعة الذاتية</p>	<p>سليستون Celestone 30 Tablets 0,5 mg/Tab. Celestone* Tabletten BETAMETASONA Schering-Plough</p>	<p>Betamethasone</p> 
<p>لا تستعمل بعد أربعة أسابيع من فتحها</p>	<p>معالجة التهاب ملتحمه العين المتهيجة والملتحمة التحسسية (نزلة العين الربيعية)</p>	<p>أوفتازولين Optizoline Tetrahydrozoline Eye Drops STERILE</p>	<p>Tetrahydrozoline</p> 
<p>لا يوجد موانع للاستعمال سوي المرضى الذين يتناولون ليفو دوبا - Levo-dopa</p>	<p>تساعد في علاج التهاب الأعصاب ، علاج الالتهاب نقص فيتامين ب 12 ، أمداد الأم الحامل بفيتامين ب المركب اللازم أثناء الحمل ، ألم أسفل الظهر والتشنجات</p>	<p>نيوروبيون فورت Neurobion Forte Neurobion® forte B-vitamiiniyhdistelmä B-vitamiinikombination B₁ + B₆ + B₁₂ 100 tabletti/tabletten</p>	<p>Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12</p>
<p>يعطى بحذر في اختلال كلوي ، المسنين تضخم البروستات ، الجلوكوما ، الأطفال دون 10 سنة الحمل فئة C</p>	<p>علاج انفصام الشخصي</p>	<p>اولان بريكسا Olan-prexa Olan-Prexa 5 Olan-Prexa 10 DOMINA</p>	<p>Olanzapine</p> 
<p>يستعمل بعد الاستشارة في الحالات: الأمراض القلبية ، ارتفاع ضغط الدم ، أمراض درقية ، سكري ،</p>	<p>لتسكين الألم الصدغي وأعراض البرد والرشح ، لتخفيف الآلام ، في حالات الاحتقان الأنفي ، الصداع ، التهاب الحلق ، السعال ،</p>	<p>3 أكت Act-3</p>	<p>Paracetamol + Dextromethorphan + Pseudoephedrine HCL</p>

<p>تضخم البروستات ، الحمل والإرضاع</p>	<p>خافض حرارة</p>		
<p>القصور الكلوي أو الكبدي ، فقر الدم الانحلالي</p>	<p>السعال بكافة أنواعه ، الأنفلونزا ونزلات البرد الراشحة ، الحالات التحسسية التي تصيب الجهاز التنفسي ، التهاب البلعوم والقصبات والجيوب</p>	<p>بكتوميد Pectomed</p> 	<p>Chlorpheniramine maleate + Bromhexine Hcl + Ephedrine Hcl</p>
<p>يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي إذا استخدم بجرعه كبيرة</p>	<p>يستخدم للحفاظ على قوه الشعر ولمعانه ويفيد في تخخين الشعر</p>	<p>بيوتين Biotin</p> 	<p>vitamin B7</p> 
<p>آلام حادة في البطن لسبب غير معروف وخصوصا عندما يرتبط مع حمى ، الأطفال اقل من 3 سنوات الحمل فئة C</p>	<p>مضاد للإسهال.</p>	<p>كابكت Kapect</p> 	<p>Kaolin + Pectin</p>
<p>يستعمل بحذر بحالة أمراض الكبد والدم ، الحامل والمرضع</p>	<p>يستخدم بحالة التشنجات العضلية القوية التي قد تصحبها حمى ، خافض حرارة</p>	<p>كي بي دي KDP-MR</p> 	<p>Diclofenac + Chlorzoxazone + Paracetamol</p>
<p>لا يستعمل للأطفال دون 4 سنوات ، لا ينصح باستعمالها للحوامل والمرضعات إلا لضرورة ملحة</p>	<p>علاج الاضطرابات البصرية ذات الطبيعة التحسسية ، وفي حالات التحسس الناتجة عن استعمال العدسات</p>	<p>دادكروم Dadcrome</p>	<p>Sodium Cromoglycate</p>

			
يجب عدم الاستخدام في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ما لم يرى الطبيب ضرورة لذلك	مضاد ومبيد فطري واسع الطيف وقاتل للوحيدات المشعرة	مازول كاتدي Candi mazol	Clotrimazole 
لا يستعمل للرضع دون شهر واحد ، لا ينصح خلال الحمل والإرضاع ،	التهابات الأمعاء والاسهال الجرثومي أو الطفيلية	فورادون Furadon	Furazolidone 
حساسية للمادة ،يمنع استخدام الوارفارين مع اوميغا3	يستخدم لرفع مستوى التركيز والقدرات الذهنية للطفل والكبار، وتأخير سن الزهايمر ، يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، ويقلل من عوامل تجلط الدم التي تنتج عنها الأزمات القلبية والجلطات، يقلل من معدلات الدهون الثلاثية، يقلل من ترسب الكوليسترول والدهون على جدار الشرايين ، ينشط الجهاز العصبي والعصلي والتناسلي	اوميغا3 omega 3	Eicosapentaenoic acid + Docosahexaenoic acid (DHA)

